

TD A1 : Trigonométrie

Exercice TD A1.1

Montrer géométriquement que

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice TD A1.2

Soit $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Résoudre l'inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$:

$$\sin x \leq \sin \alpha.$$

On écrira précisément l'ensemble des solutions.

Exercice TD A1.3

1. À quelle condition peut-on écrire $\cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos(2\theta)}{2}}$?
2. À quelle condition peut-on écrire $\sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos(2\theta)}{2}}$?
3. Calculer les valeurs exactes de : $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$, puis $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{16}\right)$.

Exercice TD A1.4

Soient x, y des réels.

1. Montrer que l'on a :

$$\cos(x+y)\cos(x-y) = \cos^2 x - \sin^2 y = \cos^2 y - \sin^2 x.$$

2. Si $\tan x$ et $\tan y$ sont bien définis, montrer que :

$$\cos(x+y)\cos(x-y) = \frac{1 - \tan^2 x \tan^2 y}{(1 + \tan^2 x)(1 + \tan^2 y)}.$$

Exercice TD A1.5

Résoudre dans \mathbb{R} , puis dans $] -\pi, \pi]$ les équations suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <i>i</i>) $\cos(4x) + \sin(4x) = 0$ | <i>ii</i>) $\cos(2x) - 2\cos x + \frac{3}{2} = 0$ |
| <i>iii</i>) $\tan(2x) = 3\tan x$ | <i>iv</i>) $\cos x + \cos(7x) = \cos(4x)$ |

Exercice TD A1.6

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Exprimer $\sin(5\theta)$ en fonction de $\sin \theta$.
2. En déduire la valeur exacte de $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$.

Exercice TD A1.7

1. Soient A et B deux réels non tous nuls. Montrer qu'il existe $r > 0$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, A \cos x + B \sin x = r \cos(x - \varphi).$$

et qu'on a les relations suivantes :

$$r = \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \cos \varphi = \frac{A}{r} \quad \text{et} \quad \sin \varphi = \frac{B}{r}.$$

2. En déduire les solutions de l'inéquation d'inconnue $x \in]-\pi, \pi]$:

$$\cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + \sqrt{3} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) + 1 \leq 0.$$

Exercice TD A1.8

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\theta \not\equiv 0 [2\pi]$. Montrer que :

$$\frac{1 - \cos((n+1)\theta) - \cos\theta + \cos(n\theta)}{2(1 - \cos\theta)} = \cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}\theta\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$